


新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社）副反応報告

当院職員を対象としたワクチン副反応の結果です。

アンケートは1回目 352名、2回目 261名分のアンケートを集計しました。

グラフ①



表②


副反応種類	1回目			2回目	
	人数	割合		人数	割合
発熱	13	4%	→	94	36%
接種部位の疼痛	282	80%	↑	216	83%
接種部位の腫脹	54	15%	↑	76	29%
接種部位の発赤	25	7%	↑	53	20%
頭痛	48	14%	↑	106	41%
筋肉痛	78	22%	↑	76	29%
関節痛	13	4%	↑	64	25%
疲労・倦怠感	71	20%	↑	117	45%
寒気	7	2%	↑	38	15%
吐き気や嘔吐	6	2%	↑	19	7%
下痢	13	4%	→	8	3%
その他	29	8%	→	24	9%

その他の副反応としては

- ◇ 接種した腕の痺れ
- ◇ 接種した部位のかゆみ


- ◇ めまい・ふらつき
- ◇ 発疹・発赤等

グラフ③



副反応が続いた期間としては、2回目の接種の方が長い傾向がありました。

グラフ④



年代別に副反応が出た数を比較したものです。20代~40代の2回目接種で、4~6個（緑色）が増えています。
 ※副反応の個数がそのまま副反応の重さを表すものではありません